


*Clef des espèces de Cincindèles canadiennes
présentes à la fois en NS; PE; NF; LB.*



Garder en mémoire qu'à l'intérieur de la même population, il y a souvent des individus aberrants....
Donc se baser sur l'observation de plusieurs individus dans le même groupe

1 Lunules humérales réduite à un ou deux points 2

2 Bande médiane peu ou non présente, labre très développé

C. longilabris (Cicindèle à grande lèvre) (Boreal Long-lipped Tiger Beetle)

Commune NF non noté Avalon peninsula, milieu sous bois clairières sabloneuses

2 Bande médiane présente, mais plus ou moins dissociée en points arrondis pronotum distinctement déprimé.

C. duodecimguttata (Cicindèle à douze points, Twelve-spotted Tiger Beetle)

Commune NF incluant Avalon-Burin SPM, milieu très variable

1 Lunule humérale présente, arquée en forme de C ou allongée 3

3 Bande marginale absente, donc lunule et bande médiane non réunies 4

4 Lunule humérale en forme de C allongé

C. repanda (Cicindèle bronzée ou commune, Bronzed Tiger Beetle)

Commune NF incluant Avalon-Burin, milieu «mud flats and sandy bars always near water»

4 Lunule humérale à branche postérieure oblique (un trait)

C. tranquebaria Cicindèle à ligne oblique Oblique-lined Tiger Beetle)


Peu commune NF milieu plages et sol sablonneux

3 Bande marginale présente (parfois interrompue, donc lunule et bande médiane plus ou moins réunies. Lunule humérale à branche postérieure rectangulaire en forme de G court, dessous de l'oeil glabre

C. hirticollis (Cicindèle à ligne obtuse, Hairy-necked Tiger Beetle)

Peu commune NF, non notée pour Avalon mais notée SPM milieu « dry, light colored sand»

*Clef des espèces de Cincindèles canadiennes
présentes à la fois en NS; PE; NF; LB.*



Garder en mémoire qu'à l'intérieur de la même population, il y a souvent des individus aberrants....
Donc se baser sur l'observation de plusieurs individus dans le même groupe

1 Lunules humérales réduite à un ou deux points 2

2 Bande médiane peu ou non présente, labre très développé

C. longilabris (Cicindèle à grande lèvre) (Boreal Long-lipped Tiger Beetle)

Commune NF non noté Avalon peninsula, milieu sous bois clairières sabloneuses

2 Bande médiane présente, mais plus ou moins dissociée en points arrondis pronotum distinctement déprimé.

C. duodecimguttata (Cicindèle à douze points, Twelve-spotted Tiger Beetle)

Commune NF incluant Avalon-Burin SPM, milieu très variable

1 Lunule humérale présente, arquée en forme de C ou allongée 3

3 Bande marginale absente, donc lunule et bande médiane non réunies 4

4 Lunule humérale en forme de C allongé

C. repanda (Cicindèle bronzée ou commune, Bronzed Tiger Beetle)

Commune NF incluant Avalon-Burin, milieu «mud flats and sandy bars always near water»

4 Lunule humérale à branche postérieure oblique (un trait)

C. tranquebaria Cicindèle à ligne oblique Oblique-lined Tiger Beetle)

Peu commune NF milieu plages et sol sablonneux

3 Bande marginale présente (parfois interrompue, donc lunule et bande médiane plus ou moins réunies. Lunule humérale à branche postérieure rectangulaire en forme de G court, dessous de l'oeil glabre

C. hirticollis (Cicindèle à ligne obtuse, Hairy-necked Tiger Beetle)

Peu commune NF, non notée pour Avalon mais notée SPM milieu « dry, light colored sand»